


Alrededor del 95% de los tumores en la vesícula se asocia a cálculos, cuyo contacto con sus paredes provoca una inflamación crónica. Debido a esta reacción, hay células que se vuelven cancerosas y comienzan a multiplicarse.

El cáncer se origina en la capa más interna de la pared de la vesícula y avanza a través del resto de su tejido mientras crece, pudiendo diseminarse también a ganglios y órganos como hígado o pulmones.

Cuando se detectan cálculos biliares, la extirpación de la vesícula es una acción preventiva recomendada por los especialistas. El GES la incluye en su canasta de prestaciones para personas entre los 35 y los 49 años.



Fuente: Globocan 2020.

Factores de riesgo

- Tener cálculos en la vesícula biliar, en especial si permanecen largo tiempo.
- Presencia de pólipos en la vesícula (riesgo aumenta si miden más de 1 cm).
- Infección vesicular por salmonella.
- Herencia genética mapuche.

Signos de alerta

El cáncer de vesícula suele no dar síntomas en etapas tempranas. Los principales son:

- Ictericia (color amarillo en la piel y en el blanco de los ojos, en etapas avanzadas).
- Dolor en el lado derecho del abdomen.

Prevención

- Cuidarse del sobrepeso y obesidad.
- Realizar al menos una ecografía abdominal después de los 40 años si existen factores que elevan el riesgo.

Tratamientos



Cirugía

El tratamiento incluye la extirpación de la vesícula biliar, además de una porción de hígado contiguo a la vesícula, y de los ganglios linfáticos regionales.



Cirugía paliativa

De descompresión (by pass) del tubo digestivo y/o biliar, si procede. Para tratar la ictericia, se puede utilizar también un drenaje biliar (prótesis) por vía endoscópica o percutánea (a través del hígado).



Radioterapia

En algunos casos, la cirugía se combina con quimioterapia para sensibilizar la célula tumoral a un tratamiento posterior con radioterapia, con el cual se destruyen las células tumorales.



Quimioterapia

Se administra a la mayoría de los pacientes que se han sometido a una cirugía. Es el tratamiento de elección cuando el cáncer vesicular ha producido metástasis a distancia.